



Tipo de trabalho: RESUMO SIMPLES (MÁXIMO 2 PÁGINAS)

AValiação Funcional em Mulheres Submetidas à Cirurgia de Câncer de Mama¹

Bruna Da Silva Pavan², Camila Dallagnol Marchioro³, Márcia De Oliveira Siqueira⁴, Matheus Santos Gomes Jorge⁵, Lia Mara Wibeling⁶, Juliana Secchi Batista⁷

¹ Pesquisa institucional desenvolvida no Departamento de Fisioterapia, pertencente ao Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Geriátrica e Reumatológica, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade de Passo Fundo.

² Enfermeira especialista em Docência do Ensino Superior. Aluna do Curso de Mestrado em Envelhecimento Humano, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade de Passo Fundo, bruupavan@gmail.com

³ Aluna do Curso de Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade de Passo Fundo, camila-np@hotmail.com.

⁴ Farmacêutica. Aluna do Curso de Mestrado em Envelhecimento Humano, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade de Passo Fundo, bolsista Prosuc/CAPES farm.marsiq@gmail.com.

⁵ Fisioterapeuta especialista em Fisioterapia Traumatológica-ortopédica. Aluno do Curso de Mestrado em Envelhecimento Humano, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade de Passo Fundo, bolsista Prosuc/CAPES, matheussgjorge@gmail.com

⁶ Doutora em Gerontologia Biomédica. Docente do Curso de Fisioterapia e do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade de Passo Fundo, liafisio@upf.br

⁷ Professora Orientadora, Mestre em Envelhecimento Humano. Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade de Passo Fundo, julianasecchi@upf.br

Introdução: O câncer de mama tem o maior índice de óbito entre todos os tipos de câncer que acometem o sexo feminino, na faixa etária acima dos 40 anos de idade. **Objetivo:** avaliar a presença de complicações funcionais em mulheres após cirurgia de câncer de mama. **Metodologia:** O estudo é transversal, longitudinal e descritivo e teve como objetivo avaliar a presença de complicações funcionais em mulheres após cirurgia de câncer de mama. Os dados foram coletados no setor de radioterapia de um hospital da cidade de Passo Fundo-RS. Inicialmente aplicou-se um questionário semiestruturado para caracterização da amostra; a avaliação das complicações funcionais primeiramente foi manual onde verificou-se a presença de restrições teciduais como aderências e fibroses em torno das cicatrizes da mama e axila operadas; presença de hematomas, alterações de temperatura e escamações da pele. Após avaliou-se a sensibilidade dos dermatômos (C6 e T4) através do estesiômetro. **Resultados:** A amostra consistiu de 92 mulheres com idade média de 55,9 ($\pm 13,7$) anos, 53 (57,6%) tinha ensino fundamental incompleto, 76 (82,6%) amamentaram, 62 (68,1%) tinham histórico de câncer na família e 38 (41,3%) realizaram quadrantectomia. Não houve influência da cirurgia de câncer de mama em relação a aderência, fibrose, hematoma, cicatriz hipertrófica e alteração de temperatura após cirurgia. Já quando avaliada a sensibilidade dos dermatômos, o dermatômo T4 apresentou



Tipo de trabalho: RESUMO SIMPLES (MÁXIMO 2 PÁGINAS)

maior número de alterações, maior perda de sensibilidade e menor percentual de sensibilidade normal quando comparado ao dermatomo de C6. **Conclusão:** Após cirurgia de mama há um maior número de alteração do dermatomo T4 (maior perda de sensibilidade e menor percentual de sensibilidade normal) quando comparado ao dermatomo C6.

Palavras-chaves: Neoplasia da mama; Sensação; Mamoplastia.