



**Tipo de trabalho:** RESUMO SIMPLES (MÁXIMO 2 PÁGINAS)

## **DERMATITE ATÓPICA E SUA RELAÇÃO COM O ALEITAMENTO MATERNO<sup>1</sup>**

**Ana Carolina Renz Simon<sup>2</sup>, Bruna Luiza Garbo<sup>3</sup>, Delci Ines Zortea  
Zanusso<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Trabalho de Conclusão de Curso

<sup>2</sup> Graduanda do curso de Medicina da UNOCHAPECÓ

<sup>3</sup> Graduanda do curso de Medicina da UNOCHAPECÓ

<sup>4</sup> Professora do curso de Medicina da UNOCHAPECÓ

**Introdução** - A dermatite atópica é uma doença de alta prevalência mundial, muito comum em crianças. Ela causa impacto negativo no paciente acometido e em sua rede familiar, devido ao seu quadro crônico, com a presença de inflamação e prurido cutâneo. Sendo assim, destaca-se a importância de esclarecer os possíveis fatores desencadeantes dessa patologia. Dentre esses fatores, discute-se o tempo do aleitamento materno e sua influência no desenvolvimento da doença.

**Objetivos** - Compreender a relação entre o tempo de aleitamento materno exclusivo e total e o desenvolvimento de dermatite atópica em crianças atendidas em uma unidade básica de saúde da cidade de Chapecó-SC.

**Metodologia** - Trata-se de um estudo observacional, analítico do tipo caso-controle. Foi analisada a totalidade de prontuários de crianças com idade entre um a quatro anos, diagnosticadas com dermatite atópica, atendidas entre os anos de 2014 e 2017, no Centro Integrado de Saúde Norte da cidade de Chapecó - SC. Para o grupo controle foram analisados prontuários do mesmo número de crianças com a mesma faixa etária, atendidas no mesmo período e local, porém sem o diagnóstico de dermatite atópica. Os dados analisados foram o sexo, o tempo de aleitamento materno exclusivo (em meses) e o tempo de aleitamento materno total (em meses). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - CEP/UNOCHAPECÓ, com número do parecer 2.841.107.

**Resultados** - Foram analisados os prontuários de 20 pacientes com dermatite atópica e de 20 pacientes sem a doença (grupo controle). O grupo de pacientes com dermatite atópica é composto por 45% de indivíduos do sexo feminino e 55% de indivíduos do sexo masculino. O grupo controle também é composto por 45% de crianças do sexo feminino e 55% de crianças do sexo masculino. Dos pacientes diagnosticados com a doença atópica, a média do tempo de aleitamento materno exclusivo foi de  $3,95 \pm 2,04$  meses e do total foi de  $11,15 \pm 9,42$  meses. Já nas crianças sem o diagnóstico, a média do tempo de aleitamento materno exclusivo foi de  $4,60 \pm 1,77$  meses e a do total foi de  $16,11 \pm 7,59$  meses.

**Conclusões** - Demonstrou-se uma possível relação entre o tempo de aleitamento materno e o desenvolvimento de dermatite atópica, já que as crianças com a doença apresentaram média de tempo de aleitamento materno exclusivo e total menor do que a média das crianças sem o



# 6° CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAÚDE CISaúde

Vigilância em Saúde: Ações de Promoção,  
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento



**Tipo de trabalho:** RESUMO SIMPLES (MÁXIMO 2 PÁGINAS)

diagnóstico.

Palavras-chave: Leite materno; dermatologia; pediatria.