ESTIMATIVA DA DISPONIBILIDADE DE FÓSFORO EM SISTEMAS DE CULTIVO ORGÂNICO DE SOJA¹

Sandra B. Vicenci Fernandes², Leonir T. Uhde², Luciano C. Gatiboni³.

INTRODUÇÃO: Os laboratórios de análise de solos dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina utilizam o método Mehlich-1 (Carolina do Norte) como extrator de fósforo (P). O Mehlich-1, assim como outros extratores ácidos, é pouco eficiente para a avaliação do P disponível em algumas circunstâncias, subestimando-o em solos argilosos e superestimando-o em solos que receberam aplicação de fosfatos naturais. A disponibilidade do P para os cultivos (forma lábil) é controlada por processos biogeoquímicos de adsorção/dessorção para o fósforo inorgânico e imobilização/mineralização para o fósforo orgânico, havendo a possibilidade de outras formas de fósforo de menor disponibilidade (pouco lábil ou não-lábil) atuar como fonte para as plantas. As doses de fosfatos naturais reativos empregadas nos sistemas de cultivo orgânico variam de 50 a 500 kg ha⁻¹ com valores médios de 140 kg ha⁻¹, associadas ao uso de adubos orgânicos de fontes diversas, com predomínio de dejetos de suínos e bovinos em doses variáveis. Pela menor solubilidade destes materiais é provável que haja acúmulo no solo de formas menos lábeis (orgânicas e inorgânicas) as quais podem atuar como tamponantes de médio prazo ao fósforo lábil extraído pelo método Mehlich-1. O objetivo deste trabalho foi de correlacionar o teor de P extraído por Mehlich-1 com as formas inorgânicas de P de menor labilidade, em condições de cultivo orgânico. **MATERIAL E MÉTODOS:** O trabalho de pesquisa foi realizado a partir de amostras de solo coletadas em unidades de produção agropecuárias na região de Três de Maio (RS), que integram o Programa de Soja Orgânico desenvolvido pela Cooperativa Triticola Alto-Uruguai – COTRIMAIO. As análises de solo (Tedesco et al., 1995) foram realizadas pelo laboratório de solos da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI e o fracionamento de fósforo pelo método de Hedley (HEDLEY et al., 1982) adaptado por Condon et al., 1985, no laboratório de solos da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Extração de P: 0,5 gramas de solo foram submetidas, sequencialmente, aos seguintes extratores: P inorgânico extraído por resina trocadora de ânions em membranas saturadas com NaHCO₃ 0,5 mol l⁻¹ (Pi-RTA); P inorgânico com NaHCO₃ 0,5 mol l⁻¹ (Pi-NaHCO₃); P inorgânico com NaOH 0,1 mol l⁻¹ (Pi- NaOH 0,1); P inorgânico com HCl 1 mol l⁻¹ (Pi-HCl); P inorgânico extraído com NaOH 0,5 mol l⁻¹ (Pi- NaOH 0,5). Assim, são extraídas formas com crescente grau de energia ao solo das mais lábeis (Pi-RTA), as mais recalcitrantes (Pi-NaOH 0,5 e Pi-HCl). As áreas agrícolas sob produção de soja orgânica são representativas de um conjunto de solos classificados como: Neossolos Litólicos eutróficos chernossólicos, Chernossolos Argilúvicos férricos típicos e Latossolo Vermelho distroférico típico (EMBRAPA, 1999 e Streck et al., 2002). **RESULTADOS:** Há uma diversidade de condições físico-químicas e merece atenção os valores de pH, que variam de 5,7 a 6,7, condições em que os fosfatos naturais tendem a ser pouco reativos no solo. A matéria orgânica varia amplamente, de 17 a 48 g kg⁻¹, significando uma contribuição igualmente variável de P nas diferentes glebas. O método RTA extraiu, em alguns solos, mais fósforo que o Mehlich-1, contrariando uma tendência de superestimativa do P pelo Mehlich-1 frente a outros métodos quando se usam fosfatos naturais. Houve uma boa correlação entre Mehlich-1

¹Projeto de Pesquisa DEAg/UNIJUI com apoio da FAPERGS através do Edital PROCOREDES

² Engenheiras Agrônomas, Professoras do Departamento de Estudos Agrários da UNIJUI. e-mail: sandravf@unijui.tche.br e uhde@unijui.tche.br

³Engenheiro Agrônomo, Professor do Departamento de Produção Animal da UDESC. e-mail: gatiboni@udesc.br

e as formas lábeis (Pi-RTA $r^2=0,95$; Pi- NaHCO_3 $r^2=0,83$) e menor correlação com as formas menos lábeis (Pi-NaOH 0,1 $r^2=0,68$; Pi-HCL= $r^20,47$). Esse resultado mostra que mesmo em solos com uso de fosfatos naturais o método Mehlich-1 é mais correlacionado com as formas lábeis que as pouco ou não lábeis. **DISCUSSÃO/CONCLUSÕES:** O método Mehlich-1 apresentou melhor correlação com as formas lábeis de fósforo, principalmente com RTA, apresentando desempenho semelhante a este na extração de P em solos sob cultivo orgânico de soja na região de Três de Maio RS. Houve tendência de menores correlações com as formas menos lábeis de fósforo, principalmente com a extraída com HCl. A aplicação de fosfato natural e os teores de argila dos solos estudados não influenciaram de forma significativa a estimativa de P pelo Mehlich-1.