ESTUDO DA ADIÇÃO DE CULTURA PROBIÓTICA ANTERIOR E POSTERIOR À FERMENTAÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS.¹

Raysa Poll², Ângela Maria Fiorentini³, Vera Maria Klajn⁴, Ana Cristina Rosso⁵, Cristiano Augusto Ballus⁶, Éverton Berwanger Balbom⁷, Stela Maris Meister Meira⁸

INTRODUÇÃO: Bebidas lácteas apresentam grande popularidade e consumo, sendo que a possível incorporação de culturas probióticas agrega o seu valor. Devido à baixa atividade proteolítica, bactérias probióticas crescem muito lentamente no leite e são empregadas em conjunto com as bactérias tradicionais do iogurte, *Streptococcus thermophilus* e *Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus*, para auxiliar no processo fermentativo. Deste modo, a cultura probiótica pode ser adicionada antes da fermentação, simultaneamente com as culturas iniciadoras do iogurte, ou após a fermentação no produto refrigerado antes do acondicionamento. Para o alcance do nível de células viáveis desejável no produto final, já foi sugerido que o procedimento ideal é cultivar *Bifidobacterium spp.* separadamente e transferir suas células ao iogurte base. Neste sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais de bebidas lácteas adicionadas da cultura probiótica *Bifidobacterium bifidum* em momento anterior e posterior ao processo fermentativo. **MATERIAL E MÉTODOS:** Duas bebidas lácteas experimentais foram elaboradas (B1 e B2) a partir de leite UHT integral, extrato hidrossolúvel de soja, soro de queijo e sacarose. Essa mistura foi submetida ao tratamento térmico (90,0°C/5 min) e após resfriada até 37°C para inoculação da cultura mista de *S. thermophilus* e *L. delbrueckii spp. bulgaricus* e condução do processo fermentativo, o qual foi interrompido em valor de pH próximo a 4,5. Em seguida, as bebidas foram homogeneizadas e estocadas sob refrigeração (3-7°C). Para a B1, a cultura probiótica *B. bifidum* foi adicionada simultaneamente com as outras culturas, enquanto para a B2, a adição foi feita após a homogeneização. As análises microbiológicas e físico-químicas foram realizadas em duplicata após 1, 7 e 14 dias de estocagem, compreendendo contagens de *S. thermophilus*, *Bifidobacterium spp.* e *L. delbrueckii subsp. bulgaricus*; determinações de pH e acidez titulável, proteólise e sinérese. Todo o experimento foi executado três vezes. Para avaliação sensorial, aplicou-se o teste de preferência-pareado para 50 provadores não-treinados, consumidores potenciais de bebidas lácteas. Para a análise estatística dos dados, aplicou-se ANOVA ao nível de 5% de significância ($P < 0,05$). **RESULTADOS:** Para as análises de proteólise e sinérese, o momento da adição da bifidobactéria não resultou em diferença significativa entre as bebidas lácteas, enquanto o pH e a acidez diferiram significativamente entre B1 e B2. Os valores de acidez foram mais elevados para B1. Esse fato pode ser justificado pelo maior acúmulo de ácidos orgânicos, já que a *B. bifidum* foi adicionada simultaneamente com as outras culturas na B1 e participou da fermentação, bem como pelo fato desta espécie ser uma bactéria heterofermentativa, produzindo ácido acético e ácido láctico em uma proporção de 3:2. Quanto às análises microbiológicas, não houve diferença significativa entre as contagens de *S. thermophilus* e *L. delbrueckii spp. bulgaricus*, apresentando valores acima de 108 UFC/mL ao final do período de estocagem. A contagem de *Bifidobacterium spp.* apesar de permanecer em 108 UFC/mL para ambas as bebidas ao longo dos dias de armazenamento, foi

ENERGIA E ALIMENTOS

XVI Seminário de Iniciação Científica
XIII Jornada de Pesquisa
IX Jornada de Extensão

UNIJUI . 23 a 26 de setembro de 2008

significativamente superior na B2, correlacionando esse fato à menor acidez desta bebida. Os resultados da avaliação sensorial, 27 provadores apontaram a bebida láctea B1 como a mais preferida, porém esse valor não indicou preferência significativa da B1 com relação à B2. Adicionalmente, o sabor recebeu 65,15% das indicações como atributo de escolha da amostra preferida. **CONCLUSÃO:** As bebidas lácteas B1 e B2 apresentaram viabilidade de bactérias que atende a legislação em vigor e boa aceitabilidade sensorial, independente da diferença dos valores de pH e acidez entre ambas, demonstrando que o momento da adição da bactéria probiótica às bebidas lácteas não influenciou sobremaneira nas características avaliadas.

¹ Pesquisa desenvolvida como parte do projeto “Aprimoramento de tecnologias para elaboração de produtos derivados de soja e leite com Probióticos”.

² Acadêmica do Curso de Química Industrial de Alimentos e bolsista voluntária. raysa-p@hotmail.com

³ Coordenadora, Professora doutora do Departamento de Biologia e Química da UNIJUI. afiore@unijui.edu.br

⁴ Pesquisadora, Professora mestre do Departamento de Biologia e Química da UNIJUI. klajn@unijui.edu.br

⁵ Acadêmica do Curso de Química Industrial de Alimentos da UNIJUI e bolsista voluntária.

aninharosso@yahoo.com.br

⁶ Bacharel em Química Industrial de Alimentos. cristiano_ballus@yahoo.com.br

⁷ Acadêmico do Curso de Química Industrial de Alimentos e bolsista voluntário.

evertonbalbom@yahoo.com.br

⁸ Acadêmica do Curso de Química Industrial de Alimentos e bolsista voluntária. stelamm@yahoo.com.br